

Kvadrupol-monopol, mágneses dipól-mágneses  
dipól kölcsönhatás és gravitációs sugárzási  
visszahatás kompakt kettős rendszerekben

Keresztes Zoltán

2002

# 1 BEVEZETÉS

A Neutron csillagok és fekete lyukak alkotta kompakt kettős rendszerek gravitációs sugárzása a Föld-bázisú interferometrikus hullám-detektorok LIGO [1], VIRGO [2], GEO [3], TAMA [4] és a tervezett, három űrszondából álló LISA detektor [5, 6] frekvencia tartományába (1-1000Hz) esik. A gravitációs sugárzás következtében a rendszer energiája és pálya impulzuszórája csökken, ami (a Hulse-Taylor pulzár esetében  $\sim 10^8$  év elteltével) a kettős kompakt rendszer tagjainak egymásba olvadásához vezet. Összeolvadásig a mozgás poszt-newtoni közelítésben tárgyalható. A detektorok az összeolvadás előtti  $\sim 15$  perces fejlődési szakaszba érkezett kettős kompakt rendszerek gravitációs sugárzásának kimutatására képesek, így a számolások is ezt a mintegy 16000 keringési ciklusnyi időt célozzák meg, azaz magas PN rendű pontosság szükséges.

Mivel a második poszt-newtoni (PN) rendig a rendszer energiája és teljes impulzuszórája állandó, és a gravitációs sugárzás 2.5 PN rend vezető hozzájárulása gyorsabban csökkenti a pályák excentricitását, mint a sugarát [7], szokás szerint a gravitációs "jelalakot" és a sugárzási visszahatást kör alakú pályákra számoljuk. Azonban a galaxisok középpontjában előforduló bizonyos kettős rendszerek pályájának excentricitása jelentős lehet [8] és [9]. A hibát, amit az okoz, hogy a ténylegesen excentrikus pályán lévő rendszer által keltett hullámot úgy vizsgáljuk, mintha körpályán lévő rendszerből származna, [10] -ben jelentősnek becsülték. Ennek következtében kívánatos egy excentrikus pályákra is kiterjedő általános tárgyalásmód. Egy ilyen a 2PN rendig érvényes tárgyalást szolgáltatott Gopakumar és Iyer [11].

De a helyzet még ennél is bonyolultabb, mivel az 1.5 PN rendű mozgásban a kettős kompakt rendszerek asztrofizikai tulajdonságai is megjelennek. Ezek spin-pálya típusú járulékok, amik tovább növelik a paraméterek számát. A második PN rendben a spin-spin, kvadrupól-monopól, illetve dipól-dipól effektusok egyaránt fellépnek. A forgó kettős kompakt rendszerek sugárzó dinamikájának szakirodalmából hiányzik az utóbbi két kölcsönhatás vizsgálata excentrikus pályákra. A dolgozat a második PN rendben jelentkező korábban nem tárgyalt kétféle kölcsönhatással foglalkozik. A gravitációs sugárzás kvadrupól-monopól járuléka a kettős kompakt rendszer monopólként tekintett egyik komponensének a másik komponens kvadrupólus-terében végzett mozgásának származéka. A mágneses dipól - mágneses dipól járuléka pedig szintén második PN rendű a  $10^{16}$  G mágneses térerősségű neutron csillagokból álló kettős kompakt rendszerek esetén, az elektromágneses sugárzásuknál is jelentősebb. (Jelenleg  $10^{15}$  G mágneses térerősséggel rendelkező neutron csillagok ismertek (magnetárok, SGR, AXP).) A perturbált Kepler-mozgásban az azonos rendű kölcsönhatások járulékai nem keverednek, hanem lineárisan adódnak össze. Ezért külön-külön vizsgálhatjuk az egyes kölcsönhatások által perturbált Kepler mozgást.

A III. fejezetben a pályának két paraméterezését származtatjuk. Kiterjesztése ez a Kepler féle valódi anólia paraméterezéseknek. Ezen paraméterezések rendelkeznek azzal az előnyös tulajdonsággal, hogy a szükséges integrálok könnyen számolhatók a reziduum tétel segítségével, azonkívül az esetek többségében

az egyetlen pólus az origóban van [23]. Tárgyalásunk közelről követi és épít a [19] és [20] eredményeire. Itt egy különös tulajdonsággal kerültünk szembe a spin-spin járulék vizsgálatával kapcsolatban, nevezetesen a pálya impulzusmomentum nagysága nem állandó mennyiség. Ezért bevezettünk egy átlagos  $\bar{L}$ -t, és a perturbált pályát  $E$ -vel, illetve  $\bar{L}$ -el jellemeztük. Ugyanúgy lehetséges a mozgás leírása  $E$ -vel és az időátlag  $\langle L \rangle$ -el, azonban így bonyolultabb kifejezések adódnak. A teljesség kedvéért kiszámoljuk  $\bar{L}$  és  $\langle L \rangle$  közti összefüggést. A III. fejezet végén ugyanazt a kifejezést kaptuk a radiális mozgás periódusára, mint a nem perturbált esetben, de az energia a perturbált mozgást jellemzi.

Ezek után meghatározzuk a második poszt-newtoni rendű kvadrupol-monopol és dipól-dipól járulékokat a gravitációs sugárzási visszahatásokban. Kiszámoltuk az energia és a pálya impulzusmomentum nagyságának veszteségeit, valamint az összeolvadó kettős kompakt rendszer impulzusmomentumának irányát jellemző szögeknek a sugárzási visszahatás okozta megváltozását.

A szakirodalomban korábban ismert, kör alakú pályákra érvényes kvadrupol-monopol és dipól-dipól kölcsönhatásoknak tulajdonítható energiaveszteségek az excentrikus pályákra érvényes eredményeink körpálya határesetével egyezést mutatnak. A kvadrupol-monopol kölcsönhatás vizsgálatával kapcsolatos eredményeinket a Phys. Rev. D publikálta (L. Á. Gergely and Z. Keresztes, Phys. Rev. D67, 024020 (2003): Gravitational radiation reaction in compact binary systems: Contribution of the quadrupole-monopole interaction). A mágneses dipól - mágneses dipól kölcsönhatásával kapcsolatos eredményeinket szintén a Phys. Rev. D -nek küldtük be. A cikk még nem jelent meg, de publikálásra el van fogadva. A címe: Gravitational radiation reaction in compact binary systems: Contribution of the magnetic dipole-magnetic dipole interaction. A szerzők: Mátyás Vasúth, Zoltán Keresztes, András Mihály és László Á. Gergely.

A fénysebességet  $c$  és a gravitációs állandót  $G$  jelöli.

## 2 A RADIÁLIS MOZGÁS

A két test közötti kvadrupol-monopol és dipól-dipól kölcsönhatás a Kepler mozgást perturbálja. A rendszerhez tartozó Lagrange függvény [21], [24], [22]:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_N + \mathcal{L}_{QM} + \mathcal{L}_{DD} , \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_N = \frac{\mu \mathbf{v}^2}{2} + \frac{Gm\mu}{r} , \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{QM} = \frac{G\mu m^3}{2r^5} \sum_{i=1}^2 p_i \left[ 3 \left( \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r} \right)^2 - r^2 \right] , \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{DD} = \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_1)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_2) - \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2] , \quad (4)$$

ahol  $\mathcal{L}_N$  a Lagrange függvény Newton-i része ( $m$  a két test együttes tömege és  $\mu$  a redukált tömeg). A két test kvadrupol-monopol kölcsönhatását  $\mathcal{L}_{QM}$  írja le, melyben  $\hat{\mathbf{S}}_i$  az  $i$ -edik test spinjének az iránya,  $p_i$  definíciója pedig:

$$p_i = \frac{Q_i}{m_i m^2} . \quad (5)$$

(az  $i$ , vagy  $j$  index mindenhol az  $i$ -edik, vagy a  $j$ -edik testre utal). Itt  $Q_i$  a kettős kompakt rendszer  $i$ -edik tengelyszimmetrikus komponensének kvadrupol-momentum skalárja [21], az  $i$ -edik test szimmetria tengelyét  $\hat{\mathbf{S}}_i$  jelöli ki. Newtoni határesetre mindkét tengelyszimmetrikus testre rövid számolással

$$Q_i = \Theta'_i - \Theta_i = -\frac{S_i}{\Omega_i} \left( \frac{\Theta_i}{\Theta'_i} - 1 \right) \quad (6)$$

összefüggés adódik, ahol  $(\Theta_i, \Theta_i, \Theta'_i)$  a fő tehetetlenségi nyomatékok,  $S_i$  a spinek nagyságai és  $\Omega_i = S_i/\Theta'_i$  a szögsebességek. A dipól-dipól kölcsönhatást  $\mathcal{L}_{DD}$  írja le, melyben  $\mathbf{n}$  a redukált tömegű testnek az össztömegű testtől számított helyvektorának iránya,  $\mathbf{d}_i$  pedig az  $i$ -edik test mágneses dipolmomentum vektora.

Más járulékok, mint PN, 2PN [11], spin-pálya (SO) [18] és spin-spin (SS) [19], [20] 3/2. és 2. poszt-newtoni rendnél jelennek meg, ezek azonban nem interferálnak a kvadrupol-monopol, illetve a dipól-dipól kölcsönhatási tagokkal. A 2. poszt-newtoni tagokban könnyű megtalálni a dipól-dipól, illetve a kvadrupol-monopol kölcsönhatásból származó járulékokat. A dipól-dipól kölcsönhatási tagok felismerhetők azáltal, hogy mágneses dipolmomentum nagyságban másodfokúak, a kvadrupol-monopol tagokat pedig egy  $p_i$  megkülönböztető paraméter jelöli. Ezért a 2. poszt-newtoni tagok mindegyik járuléka függetlenül számolható. Tulajdonképpen először interferenciából származó tag 5/2. rendben jelenik meg a SO-tagok első PN korrekciójaként [25].

A gyorsulás könnyen számolható (1)-ből

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_N + \mathbf{a}_{QM} , \quad (7)$$

$$\mathbf{a}_N = -\frac{Gm\mathbf{r}}{r^3} , \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{QM} = & -\frac{3Gm^3}{2r^7} \sum_{i=1}^2 p_i \left[ 5 \left( \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r} \right)^2 - r^2 \right] \mathbf{r} \\ & + \frac{3Gm^3}{r^5} \sum_{i=1}^2 p_i \left( \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r} \right) \hat{\mathbf{S}}_i , \end{aligned} \quad (9)$$

$$\mathbf{a}_{DD} = \frac{3}{\mu r^4} \left\{ [\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 - 5(\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_1)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_2)] \mathbf{n} + \sum_{i \neq j} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_i) \mathbf{d}_j \right\} . \quad (10)$$

Az  $\mathbf{a}_{QM}$  gyorsulás a gyorsulás megegyezik [13] (55)-(56) egyenleteivel, az  $\mathbf{a}_{DD}$  pedig a [22] (5) egyenletével, végrehajtva a jelölésben a megfelelő cseréket.

Mivel a kvadrupol-monopol és dipól-dipól kölcsönhatásokat leíró Lagrange függvény nem explicit idő függő a rendszer teljes energiája  $E$  megmaradó mennyiség. További megjegyzés, hogy  $\mathcal{L}_{QM}$  és  $\mathcal{L}_{DD}$  akárcsak a spin-spin kölcsönhatás Lagrange függvénye nem függ a sebességtől. Ezért  $\mathbf{p} = \mu \dot{\mathbf{r}}$  és két következtetés vonható le:

(a.) az energia kifejezése

$$E = E_N - \mathcal{L}_{QM} - \mathcal{L}_{DD} , \quad (11)$$

(b.) a pálya impulzuszórában nincs kvadrupol-monopol, vagy dipól-dipól kölcsönhatás típusú járulék

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{L}_N . \quad (12)$$

A newtoni energia  $E_N$  és a newtoni pálya impulzuszórá nagysága  $L_N$  megmaradó mennyiségek. Gömbi polár koordinátában:

$$E_N = \frac{\mu v^2}{2} - \frac{Gm\mu}{r} \quad (13)$$

$$= \frac{\mu}{2} [\dot{r}^2 + r^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)] - \frac{Gm\mu}{r} ,$$

$$L_N^2 = \mu^2 r^4 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) . \quad (14)$$

Az első kifejezésből megkapjuk a sebességet, a két egyenletet egymással kombinálva pedig a radiális mozgás egyenletet (utóbbi a radiális egyenlet):

$$v^2 = \frac{2E_N}{\mu} + \frac{2Gm}{r} , \quad (15)$$

$$\dot{r}^2 = \frac{2E_N}{\mu} + \frac{2Gm}{r} - \frac{L_N^2}{\mu^2 r^2} . \quad (16)$$

Ezen kifejezések azonosságok, azonban ha a Kepler mozgás perturbált  $E_N$  és  $L_N$  -re nem lesznek mozgásállandók. A (9) és (10) egyenletek mindkét oldalát  $\mu \mathbf{r}$  -el keresztszorzva adódik a pálya impulzuszórá időfejlődése:

$$\dot{\mathbf{L}} = \frac{3G\mu m^3}{r^5} \sum_{i=1}^2 p_i (\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r}) (\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{S}}_i) + \frac{3}{r^3} \sum_{i \neq j} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_i) (\mathbf{n} \times \mathbf{d}_j) . \quad (17)$$

A kvadrupol-monopol kölcsönhatásnak köszönhetően a spinek precessziós mozgást végeznek, ezt korábban Barker és O'Connell kiszámolta ([13] -ben lásd a (39) és (43)-as egyenleteket). A spinprecessziós egyenletet a függelékben vezetjük le:

$$\dot{\hat{\mathbf{S}}}_i = -\frac{3G\mu m^3}{r^5} p_i (\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r}) (\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{S}}_i) . \quad (18)$$

A spin vektorok időfejlődése a dipól-dipól kölcsönhatás miatt (lásd [22] -ban a (8) egyenletet):

$$\dot{\mathbf{S}}_i = \mathbf{d}_i \times \mathbf{H}_j = \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_j)(\mathbf{d}_i \times \mathbf{n}) - \mathbf{d}_j \times \mathbf{d}_i] . \quad (19)$$

Innen egyenesen következik, hogy a teljes impulzusmomentum megmaradó mennyiség

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 . \quad (20)$$

Megszorozva a (17) egyenletet a pálya impulzusmomentum irányával  $\hat{\mathbf{L}}$  kapjuk a pálya impulzusmomentum nagyságának időfejlődését:

$$\dot{L} = \frac{3G\mu m^3}{r^5} \sum_{i=1}^2 p_i (\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r}) \hat{\mathbf{L}} \cdot (\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{S}}_i) + \frac{3\mu}{Lr^2} \sum_{i \neq j} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}_i)(\mathbf{v} - \dot{r}\mathbf{n}) \cdot \mathbf{d}_j . \quad (21)$$

Tekintsük a dolgozat végén található 1. és 2. ábrát. Három koordináta rendszert vettünk fel, melyeket  $\mathcal{K}$  és  $\mathcal{K}^i$  -vel jelöltünk, bázisvektoraik ( $\hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{L}}$ ) és ( $\hat{\mathbf{b}}_i, \hat{\mathbf{S}}_i \times \hat{\mathbf{b}}_i, \hat{\mathbf{S}}_i$ ) . A mágneses dipólmomentum vektorok komponensei a  $\mathcal{K}^i$  koordináta rendszerben:  $d_i(\sin \alpha_i \cos \beta_i, \sin \alpha_i \sin \beta_i, \cos \alpha_i)$ . A spinvektorok komponensei a  $\mathcal{K}$  koordináta rendszerben:  $\mathbf{S}_i = S_i(\sin \kappa_i \cos \psi_i, \sin \kappa_i \sin \psi_i, \cos \kappa_i)$  . Ahhoz, hogy koordinátás alakban megadjuk a pálya impulzusmomentum nagyságának időfejlődését  $\dot{L}$ -ot, szükséges, hogy mind a mágneses dipólmomentum vektorok, mind a spinvektorok ugyanazon rendszerben legyenek felírva. Végrehajtjuk a  $\mathcal{K}^i \rightarrow \mathcal{K}$  transzformációt a  $\hat{\mathbf{b}}_i$  , illetve  $\hat{\mathbf{L}}$  vektorok által kijelölt tengely körüli  $-\kappa_i$  , illetve  $-\tau_i$  szögű forgatások szorzataként, ahol  $\tau_i = \cos^{-1}(\hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{b}}_i)$  . A 2. ábráról látható, hogy fennáll a következő reláció:  $\tau_i + \psi_i = \pi/2$  . A  $\mathcal{K}$  rendszerben vezető rendben érvényesek a következő kifejezések (felhasználva  $\dot{\psi} = L/\mu r^2$  kifejezést):

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \\ 0 \end{pmatrix} , & \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{S}}_i &= r \sin \kappa_i \cos(\psi - \psi_i) , \\ \hat{\mathbf{L}} \cdot (\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{S}}_i) &= -r \sin \kappa_i \sin(\psi - \psi_i) , \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{n} + \frac{L}{\mu r} \begin{pmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \\ 0 \end{pmatrix} , \\ \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{S}}_i &= \dot{r} \sin \kappa_i \cos(\psi - \psi_i) - \frac{L}{\mu r} \sin \kappa_i \sin(\psi - \psi_i) , \\ \mathbf{d}_i &= d_i \begin{pmatrix} \rho_i \sin \psi_i + \sigma_i \cos \psi_i \\ \sigma_i \sin \psi_i - \rho_i \cos \psi_i \\ \cos \alpha_i \cos \kappa_i - \sin \alpha_i \sin \beta_i \sin \kappa_i \end{pmatrix} , \quad (22) \\ \rho_i &= \sin \alpha_i \cos \beta_i , & \sigma_i &= \sin \alpha_i \sin \beta_i \cos \kappa_i + \cos \alpha_i \sin \kappa_i . \quad (23) \end{aligned}$$

A pálya impulzusmomentum nagyságának időfejlődésére kapjuk

$$\dot{L} = -\frac{3G\mu m^3}{2r^3} \sum_{i=1}^2 p_i \sin^2 \kappa_i \sin 2(\chi + \psi_0 - \psi_i) + \frac{3d_1 d_2}{2r^3} \mathcal{B}'_2(\chi), \quad (24)$$

ahol

$$\mathcal{B}_k(\chi) = (\sigma_1 \sigma_2 - \rho_1 \rho_2) \cos(k\chi + \delta) - (\rho_1 \sigma_2 + \rho_2 \sigma_1) \sin(k\chi + \delta), \quad (25)$$

és  $\mathcal{B}'_k(\chi)$  a  $\mathcal{B}_k(\chi)$ -nek a  $\chi$  szerinti deriváltja. A  $\chi = \psi - \psi_0 \in [0, 2\pi]$  az általánosított valódi anomália paraméter, amely newtoni határesetre egybeesik a Kepler-i valódi anomáliával. A  $\delta = \delta_1 + \delta_2$ , ahol  $\delta_i = (\psi_0 - \psi_i)$ . A pálya impulzumomentum nagysága nem konstans, mint ahogyan a PN, 2PN, SO effektusoknál tapasztalható. Ez a probléma azonban áthidalható egy megfelelően definiált átlaggal  $\bar{L}$ -el. A radiális egyenlet megoldásához szükség van a pálya impulzumomentum nagyságára  $L(\chi)$ , amely a következőképpen írható:

$$L(\chi) = L_0 + \int_0^\chi \dot{L} \frac{dt}{d\chi'} d\chi', \quad (26)$$

ahol  $L_0 = L(0)$  és a  $\chi$ -re vezető rendben érvényes:

$$\frac{dt}{d\chi} = \frac{\mu r^2}{\bar{L}}, \quad (27)$$

ahol  $\bar{L}$  a pálya impulzumomentum nagyságának szögátlagát jelöli és az integrálást elvégezve adódik:

$$\begin{aligned} L(\chi) = & L_0 + \frac{G\mu^3 m^3}{4\bar{L}^3} \sum_{i=1}^2 p_i \sin^2 \kappa_i H \\ & - \frac{\mu^2 d_1 d_2}{2\bar{L}^3} \{ (3Gm\mu + 4\bar{A}) \mathcal{B}_0 \\ & - (3Gm\mu + 4\bar{A} \cos \chi) \mathcal{B}_2(\chi) + \bar{A} \sin \chi \mathcal{B}'_2(\chi) \}, \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} H = & 3Gm\mu [\cos 2(\chi + \psi_0 - \psi_i) - \cos 2(\psi_0 - \psi_i)] \\ & + 4\bar{A} [\cos \chi \cos 2(\chi + \psi_0 - \psi_i) - \cos 2(\psi_0 - \psi_i)] \\ & + 2\bar{A} \sin \chi \sin 2(\chi + \psi_0 - \psi_i), \end{aligned} \quad (29)$$

ahol  $\bar{A}$  az  $E$  és  $\bar{L}$  által jellemzett Kepler mozgáshoz tartozó Laplace-Runge-Lenz vektor nagysága:

$$\bar{A} = \left( G^2 m^2 \mu^2 + \frac{2E\bar{L}^2}{\mu} \right)^{1/2}. \quad (30)$$

Látható, hogy  $L(0) = L(2\pi) = L_0$ . A pálya impulzumomentum nagysága a kvadrupól-monopól és dipól-dipól kölcsönhatások miatt periodikusan változik.

Innen  $\bar{L}$  a pálya impulzusmomentum szögátlaga:

$$\begin{aligned}\bar{L} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} L(\chi) d\chi = L_0 - \frac{3G\mu^3 m^3 (3Gm\mu + 4\bar{A})}{4\bar{L}^3} \\ &\times \sum_{i=1}^2 p_i \sin^2 \kappa_i \cos 2(\psi_0 - \psi_i) , \\ &- \frac{\mu^2 d_1 d_2}{2\bar{L}^3} (3Gm\mu + 4\bar{A}) \mathcal{B}_0 .\end{aligned}\quad (31)$$

így a (28) és (31) -ből

$$\begin{aligned}L(\chi) &= \bar{L} + \frac{G\mu^3 m^3}{4\bar{L}^3} \sum_{i=1}^2 p_i \sin^2 \kappa_i \{2\bar{A} \cos(\chi + \mathcal{B}_i) \\ &+ (3G\mu m + 2\bar{A} \cos \chi) \cos 2(\chi + \delta_i)\} \\ &+ \frac{\mu^2 d_1 d_2}{2\bar{L}^3} [(3Gm\mu + 4\bar{A} \cos \chi) \mathcal{B}_2(\chi) - \bar{A} \sin \chi \mathcal{B}'_2(\chi)] .\end{aligned}\quad (32)$$

A teljes energia kvadrupól-monopól ( $E_{QM}(r, \chi)$ ) és dipól-dipól ( $E_{DD}(r, \chi)$ ) kölcsönhatásokból származó része:

$$E_{QM}(r, \chi) = \frac{G\mu m^3}{2r^3} \sum_{i=1}^2 p_i [1 - 3\sin^2 \kappa_i \cos^2(\chi + \delta_i)] ,\quad (33)$$

$$E_{DD}(r, \chi) = \frac{d_1 d_2}{2r^3} [\mathcal{A}_0 - 3\mathcal{B}_2(\chi)] ,\quad (34)$$

ahol

$$\mathcal{A}_0 = 2 \cos \lambda + 3(\rho_1 \sigma_2 - \rho_2 \sigma_1) \sin \Delta\psi - 3(\rho_1 \rho_2 + \sigma_1 \sigma_2) \cos \Delta\psi .\quad (35)$$

A  $\lambda$  szög a dipólmomentumok által bezárt szög, a  $\Delta\psi = \psi_2 - \psi_1$  .

Így a(15) és (16) összefüggések:

$$v^2 = \frac{2[E - E_{QM}(r, \chi) - E_{DD}(r, \chi)]}{\mu} + \frac{2Gm}{r} ,\quad (36)$$

$$\dot{r}^2 = \frac{2[E - E_{QM}(r, \chi) - E_{DD}(r, \chi)]}{\mu} + \frac{2Gm}{r} - \frac{L(\chi)^2}{\mu^2 r^2}\quad (37)$$

alakban írhatók. ahol  $L(\chi)$  -t ,  $E_{QM}(r, \chi)$  -t és  $E_{DD}(r, \chi)$  -t a (32) , (33) és (34) egyenletek adják. A  $\chi$  paraméter csak a második poszt-newtoni tagokban jelenik meg.



### 3 A valódi és excentrikus anomália paraméterezések

Először az általánosított valódi anomália paraméterezéssel foglalkozunk  $r = r(\chi)$ . A radiális mozgás forduló pontjainak definíciója:

$$\begin{aligned} r_{min} &= r(0) , & \dot{r}^2(0) &= 0 , \\ r_{max} &= r(\pi) , & \dot{r}^2(\pi) &= 0 . \end{aligned} \quad (38)$$

A forduló pontokban a pálya impulzuszómomentum nagysága  $L(0) = \bar{L} + \delta L_-$  és  $L(\pi) = \bar{L} + \delta L_+$ . A  $\delta L_{\pm} = \delta(L_{QM\pm} + L_{DD\pm}) = \delta L_{QM\pm} + \delta L_{DD\pm}$ , ahol

$$\delta L_{QM\pm} = \frac{G\mu^3 m^3}{4\bar{L}^3} (3Gm\mu \mp 4\bar{A}) \sum_{i=1}^2 p_i \sin^2 \kappa_i \cos 2\delta_i , \quad (39)$$

$$\delta L_{DD\pm} = \frac{\mu^2 d_1 d_2}{2\bar{L}^3} [(3Gm\mu + 4\bar{A})(\sigma_1 \sigma_2 - \rho_1 \rho_2)] \quad (40)$$

A forduló pontokban megoldva a radiális egyenletet:

$$\begin{aligned} r_{min}^{max} &= \frac{Gm\mu \pm \bar{A}}{-2E} + \frac{G\mu^2 m^3}{4\bar{A}\bar{L}^2} \sum_{i=1}^2 p_i \rho_{\mp}^i \\ &\quad + \frac{\mu d_1 d_2}{2\bar{A}\bar{L}^2} \{(\bar{A} \mp Gm\mu)\mathcal{A}_0 + \bar{A}\mathcal{B}_0\} , \\ \rho_{\mp}^i &= \alpha_0^i (\bar{A} \mp Gm\mu) + \beta_0^i (4\bar{A} \mp 3Gm\mu) , \\ \alpha_0^i &= 2 [1 - 3\sin^2 \kappa_i \cos^2(\psi_0 - \psi_i)] , \\ \beta_0^i &= \sin^2 \kappa_i \cos 2(\psi_0 - \psi_i) , \end{aligned} \quad (41)$$

ahol a  $\frac{Gm\mu \pm \bar{A}}{-2E} = \frac{\bar{L}^2}{\mu(Gm\mu \mp \bar{A})}$  a Kepler mozgás forduló pontjai.

A  $\chi$  általánosított valódi anomália paraméter definíciója

$$\frac{2}{r} = \left( \frac{1}{r_{min}} + \frac{1}{r_{max}} \right) + \left( \frac{1}{r_{min}} - \frac{1}{r_{max}} \right) \cos \chi , \quad (42)$$

amelyből kapható

$$\begin{aligned} r &= \frac{\bar{L}^2}{\mu(Gm\mu + \bar{A} \cos \chi)} + \frac{G\mu^2 m^3}{4\bar{A}\bar{L}^2 (Gm\mu + \bar{A} \cos \chi)^2} \sum_{i=1}^2 p_i \Lambda^i \\ &\quad + \frac{\mu d_1 d_2 \Lambda}{2\bar{A}\bar{L}^2 (Gm\mu + \bar{A} \cos \chi)^2} , \end{aligned} \quad (43)$$

ahol

$$\begin{aligned}
\Lambda^i &= \bar{A}[\bar{A}^2(\alpha_0^i + 4\beta_0^i) + (Gm\mu)^2(3\alpha_0^i + 10\beta_0^i)] \\
&+ Gm\mu[\bar{A}^2(3\alpha_0^i + 11\beta_0^i) + (Gm\mu)^2(\alpha_0^i + 3\beta_0^i)] \cos \chi, \\
\Lambda &= \bar{A}[(3G^2m^2\mu^2 + \bar{A}^2)\mathcal{A}_0 + (G^2m^2\mu^2 + \bar{A}^2)\mathcal{B}_0] \\
&+ Gm\mu[(G^2m^2\mu^2 + 3\bar{A}^2)\mathcal{A}_0 + 2\bar{A}^2\mathcal{B}_0] \cos \chi.
\end{aligned} \tag{44}$$

$T$  a radiális mozgás periódusa könnyen számolható az általánosított excentrikus anomália paraméterezéssel, ennek definíciója:

$$2r = (r_{max} + r_{min}) - (r_{max} - r_{min}) \cos \xi, \tag{45}$$

ebből a  $\chi$  paraméterezésnél elvégzett hasonló számolással kapható

$$\begin{aligned}
r &= \frac{Gm\mu - \bar{A} \cos \xi}{-2E} + \frac{G\mu^2 m^3}{4\bar{A}\bar{L}^2} \sum_{i=1}^2 p_i \Xi^i \\
&+ \frac{\mu d_1 d_2}{2\bar{A}\bar{L}^2} \{ \bar{A}(\mathcal{A}_0 + \mathcal{B}_0) + Gm\mu\mathcal{A}_0 \cos \xi \},
\end{aligned} \tag{46}$$

ahol

$$\Xi^i = \bar{A}(\alpha_0^i + 4\beta_0^i) + Gm\mu(\alpha_0^i + 3\beta_0^i) \cos \xi. \tag{47}$$

Megjegyzés, hogy  $\rho_{\mp}^i$ ,  $\Lambda^i$  és  $\Xi^i$  kifejezései ugyanolyan alakúak, mint a spin-spin kölcsönhatás vizsgálatánál a  $\rho_{\mp}^i$ ,  $\Lambda^i$ ,  $\Xi^i$ , csak a bennük szereplő  $\alpha_0^i$  és  $\beta_0^i$  különbözik  $\alpha_0$ ,  $\beta_0$  -tól ([19]).

A két fajta paraméterezéssel lehetőség nyílik az időátlag számolására is. Tekintve például a valódi anomália paraméterezést (46), egy  $f(\chi)$  függvény időátlaga:

$$\langle f \rangle = \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} f(\chi) \frac{dt}{d\chi} d\chi. \tag{48}$$

A  $dt/d\chi = (1/\dot{r})(dr/d\chi)$  kifejezés első faktorát (37) egyenlet Taylor sorából kapjuk, második faktort pedig a (42)  $\chi$  szerinti deriválásával:

$$\frac{dr}{d\chi} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{r_{min}} - \frac{1}{r_{max}} \right) r^2 \sin \chi. \tag{49}$$

Bevezetve egy komplex paramétert  $z = \exp(i\chi)$  az integrál (48) könnyen számolható a reziduum tétel segítségével. A számolásokhoz még felhasználható, hogy vezető rendben érvényes:

$$\dot{r} = \frac{\bar{A}}{\bar{L}} \sin \chi, \tag{50}$$

ami (42)-ből levezethető.

A periódus idő meghatározására a  $\xi$  paraméterezést használva írhatjuk:

$$T = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{d\xi} d\xi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\dot{r}} \frac{dr}{d\xi} d\xi, \quad (51)$$

amiben  $1/\dot{r}$ -ot most is (37) Taylor sorából vesszük,  $dr/d\xi$ -t pedig (45)  $\xi$  szerinti deriváltjából fejezzük ki. Innen közvetlen integrálással, vagy a reziduum tétel felhasználásával a periódus idő meghatározható:

$$T = 2\pi Gm \left( \frac{\mu}{-2E} \right)^{3/2}. \quad (52)$$

Érdekes, hogy a periódus idő alakilag megegyezik a Kepler mozgást jellemző periódus idővel, persze a képletben szereplő energia a perturbált rendszerre jellemző. A két paraméterezés alkalmas  $L$  időátlagának meghatározására. A  $\chi$  paraméterezést választva írhatjuk:

$$\langle L \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T L(\chi) dt = \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} L(\chi) \frac{dt}{d\chi} d\chi. \quad (53)$$

Az előbb említett eljárást alkalmazva a reziduum tétel felhasználásával az eredmény:

$$\begin{aligned} \langle L \rangle &= \bar{L} + \frac{Gm^3 \mu^2 F_1}{4\bar{A}^2 \bar{L}^3 F_2} \sum_{i=1}^2 p_i \sin^2 \kappa_i \cos 2\delta_i \\ &+ \frac{d_1 d_2 B_0}{2\mu \bar{A}^2 \bar{L}^3} \left[ Gm\mu^4 (2G^2 m^2 \mu^2 - 3\bar{A}^2) - 2(-2\mu E)^{3/2} \bar{L}^3 \right], \quad (54) \end{aligned}$$

ahol

$$\begin{aligned} F_1 &= 2\bar{L}(-2\mu E)^{1/2} [\bar{A}^6 - 15G^2 m^2 \mu^2 \bar{A}^4 + 32G^4 m^4 \mu^4 \bar{A}^2 - 16G^6 m^6 \mu^6] \\ &+ Gm\mu^2 [-11\bar{A}^6 + 58G^2 m^2 \mu^2 \bar{A}^4 - 80G^4 m^4 \mu^4 \bar{A}^2 + 32G^6 m^6 \mu^6] \\ F_2 &= 4Gm\bar{L}(-2\mu E)^{1/2} [\bar{A}^2 - 2G^2 m^2 \mu^2] \\ &+ \bar{A}^4 - 8G^2 m^2 \mu^2 \bar{A}^2 + 8G^4 m^4 \mu^4. \quad (55) \end{aligned}$$

## 4 SUGÁRZÁSI VISSZAHATÁS

### 4.0.1 Energia veszteség

Az energia pillanatnyi veszteségének vezető rendjeit az Einstein kvadrupol formula adja:

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{G}{5c^5} I^{(3)jl} I^{(3)jl},$$

ahol a kerek zárójelbe tett számok időderiváltat jelentenek,  $I^{jl}$  a rendszer tömeg kvadrupol momentuma, melynek vezető rendje:

$$I_N^{jl} = \mu (x^j x^l)^{STF} , \quad (56)$$

ahol  $(x^j x^l)^{STF}$  jelentése:

$$I_N^{jl} = \mu x^j x^l , \quad (57)$$

ha  $j$  nem egyenlő  $l$  -el és  $j = l$  esetén pedig:

$$I_N^{jj} = \mu x^j x^j - \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \mu x^j x^j , \quad (58)$$

A newtoni, a kvadrupol-monopol és dipól-dipól kölcsönhatások hozzájárulása az energia veszteséghez:

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{G}{5c^5} I_N^{(3)jl}(\mathbf{a}_N) I_N^{(3)kl}(\mathbf{a}_N) - \frac{2G}{5c^5} I_N^{(3)jl}(\mathbf{a}_{QM}) I_N^{(3)kl}(\mathbf{a}_N) . \quad (59)$$

Az argumentumokba írt gyorsulások arra utalnak, hogy a számolás elvégzésekor  $\mathbf{r}$  második deriváltja helyébe mi írható. A  $v^2$  -et és  $\dot{r}^2$  -et (36) , (37) adja,  $L(\chi)$  -t ,  $E_{QM}(r, \chi)$  -t és  $E_{DD}(r, \chi)$  -t pedig (32) , (33) , (34). Ezek felhasználásával:

$$\frac{dE}{dt} = \left( \frac{dE}{dt} \right)_N + \left( \frac{dE}{dt} \right)_{QM} + \left( \frac{dE}{dt} \right)_{DD} , \quad (60)$$

$$\left( \frac{dE}{dt} \right)_N = -\frac{8G^3 m^2}{15c^5 r^6} (2\mu E r^2 + 2Gm\mu^2 r + 11\bar{L}^2) , \quad (61)$$

$$\begin{aligned} \left( \frac{dE}{dt} \right)_{QM} &= \frac{2G^3 m^4}{15c^5 \bar{L}^2 r^8} \sum_{i=1}^2 p_i \\ &\times \left\{ \sum_{n=1}^3 a_n \cos[n\chi + 2\delta_i] \sin^2 \kappa_i + a_4 (2 - 3 \sin^2 \kappa_i) \right\} , \quad (62) \end{aligned}$$

$$\left( \frac{dE}{dt} \right)_{DD} = \frac{4G^2 m d_1 d_2}{15c^5 \mu \bar{L}^2 r^8} \left\{ \sum_{k=1}^3 a_k \mathcal{B}_k(\chi) + a_4 \mathcal{A}_0 \right\} , \quad (63)$$

ahol  $a_k$  :

$$\begin{aligned} a_1 &= 3\mu \bar{A} r (-22Gm\mu^2 r + 17\bar{L}^2) , \\ a_2 &= 6(-11G^2 m^2 \mu^4 r^2 + 6E\bar{L}^2 \mu r^2 + 5Gm\mu^2 \bar{L}^2 r - 51\bar{L}^4) , \\ a_3 &= -\mu \bar{A} r (22Gm\mu^2 r + 51\bar{L}^2) , \\ a_4 &= 2\bar{L}^2 (-6E\mu r^2 - 5Gm\mu^2 r + 39\bar{L}^2) . \quad (64) \end{aligned}$$

Az energia veszteség átlagolásánál a valódi anomália paramétert használjuk. Bevezetünk egy komplex paramétert  $z = \exp(i\chi)$  és felhasználjuk a reziduum tételt (megjegyzés: pólus csak az origóban van) és kapjuk az energia veszteség időátlagára:

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_N + \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_{QM} + \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_{DD} , \quad (65)$$

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_N = -\frac{G^2 m (-2E\mu)^{3/2}}{15c^5 \bar{L}^7} \times (148E^2 \bar{L}^4 + 732G^2 m^2 \mu^3 E \bar{L}^2 + 425G^4 m^4 \mu^6) , \quad (66)$$

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_{QM} = \frac{G^2 \mu m^3 (-2E\mu)^{3/2}}{30c^5 \bar{L}^{11}} \times \sum_{i=1}^2 p_i [C_1 \sin^2 \kappa_i \cos 2\delta_1 + C_2 (2 - 3 \sin^2 \kappa_i)] , \quad (67)$$

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle_{DD} = \frac{G^2 d_1 d_2 (-2E\mu)^{3/2}}{15c^5 \bar{L}^{11}} (C_1 \mathcal{B}_0 + C_2 \mathcal{A}_0) , \quad (68)$$

ahol  $C_k$  :

$$\begin{aligned} C_1 &= -\mu \bar{A}^2 (948E^2 \bar{L}^4 + 8936G^2 E \bar{L}^2 m^2 \mu^3 + 8335G^4 m^4 \mu^6) , \\ C_2 &= 708E^3 \bar{L}^6 + 10020G^2 E^2 \bar{L}^4 m^2 \mu^3 + 18865G^4 E \bar{L}^2 m^4 \mu^6 \\ &\quad + 8316G^6 m^6 \mu^9 . \end{aligned} \quad (69)$$

#### 4.0.2 Változás a pálya impulzusmomentum nagyságában

Az  $L$  pálya impulzusmomentum nagysága számolható a következőképpen [19]:

$$\frac{dL}{dt} = \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} - \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{S}_1}{dt} - \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{S}_2}{dt} .$$

Szükség van a tengelyszimetrikus testek spinjei sugárzási veszteségének időátlagára. A Burke-Thorne potenciál felhasználásával [18]:

$$\frac{1}{S_i} \frac{d(\mathbf{S}_i)_\mu}{dt} = \frac{2G}{5c^5 \Omega_i} \left( \frac{\Theta_i}{\Theta'_i} - 1 \right) \epsilon_{\mu\nu\rho} I_N^{(5)\nu\sigma} (\hat{\mathbf{S}}_i)_\rho (\hat{\mathbf{S}}_i)_\sigma , \quad (70)$$

és mivel  $\mathbf{S}_i$  precessziós mozgást végez adódik  $d\mathbf{S}_i/dt = S_i d\hat{\mathbf{S}}_i/dt$ . Követve [20]-t kapjuk:

$$\left\langle \frac{d\mathbf{S}_i}{dt} \right\rangle = 0 . \quad (71)$$

Tehát a pálya impulzusmomentum nagysága számolható:

$$\frac{dL}{dt} \simeq \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} . \quad (72)$$

$\mathbf{J}$  sugárzási vesztesége vezető rendben:

$$\frac{d\mathbf{J}^i}{dt} = -\frac{2G}{5c^5} \epsilon^{ijk} I^{(2)jl} I^{(3)kl} , \quad (73)$$

ahol  $\epsilon^{ijk}$  az antiszimmetrikus Levi-Civita szimbólum. A newtoni, a kvadrupol-monopol és dipól-dipól kölcsönhatások hozzájárulása a teljes impulzusmomentum veszteséghez:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{J}^i}{dt} = & -\frac{2G}{5c^5} \epsilon^{ijk} I_N^{(2)jl}(\mathbf{a}_N) I_N^{(3)kl}(\mathbf{a}_N) \\ & -\frac{2G}{5c^5} \epsilon^{ijk} \left[ I_N^{(2)jl}(\mathbf{a}_N) I_N^{(3)kl}(\mathbf{a}_{QM}) + I_N^{(2)jl}(\mathbf{a}_{QM}) I_N^{(3)kl}(\mathbf{a}_N) \right] . \end{aligned} \quad (74)$$

Vezető rendben:  $\hat{\mathbf{L}} = (0, 0, 1)$ , így a következő pillanatnyi veszteségek adódnak:

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} = \left( \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_N + \left( \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{QM} + \left( \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{DD} , \quad (75)$$

$$\left( \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_N = \frac{8G^2 m \bar{L}}{5c^5 \mu r^5} (2\mu E r^2 - 3\bar{L}^2) , \quad (76)$$

$$\begin{aligned} \left( \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{QM} = & \frac{2G^2 m^3}{5c^5 \mu \bar{L} r^7} \sum_{i=1}^2 p_i \\ & \times \left\{ \sum_{n=1}^3 b_n \cos[n\chi + 2\delta_i] \sin^2 \kappa_i + b_4 (2 - 3 \sin^2 \kappa_i) \right\} , \end{aligned} \quad (77)$$

$$\left( \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{DD} = \frac{4G d_1 d_2}{5c^5 \mu^2 \bar{L}^3 r^7} \left\{ \sum_{k=1}^3 b_k \mathcal{B}_k(\chi) + b_4 \mathcal{A}_0 \right\} , \quad (78)$$

ahol  $b_k$  :

$$\begin{aligned} b_1 &= 3\mu \bar{A} r (2G E m \mu^3 r^3 - E \bar{L}^2 \mu r^2 - 9G \bar{L}^2 m \mu^2 r + 8\bar{L}^4) , \\ b_2 &= 3(2G^2 E m^2 \mu^5 r^4 + 22E \bar{L}^4 \mu r^2 - 9G^2 \bar{L}^2 m^2 \mu^4 r^2 + 10G \bar{L}^4 m \mu^2 r - 19\bar{L}^6) , \\ b_3 &= \mu \bar{A} r (2G E m \mu^3 r^3 + 3E \bar{L}^2 \mu r^2 - 9G \bar{L}^2 m \mu^2 r - 24\bar{L}^4) , \\ b_4 &= \bar{L}^4 (-18E \mu r^2 - 8G m \mu^2 r + 15\bar{L}^2) . \end{aligned} \quad (79)$$

Az átlagolásnál hasonló eljárást alkalmazva, mint az energia veszteségnél számolható, hogy:

$$\left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle_N + \left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle_{QM} + \left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle_{DD} , \quad (80)$$

$$\left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle_N = -\frac{4G^2 m (-2\mu E)^{3/2}}{5c^5 \bar{L}^4} (14E\bar{L}^2 + 15G^2 m^2 \mu^3) , \quad (81)$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle_{QM} &= \frac{G^2 m^3 \mu (-2\mu E)^{3/2}}{10c^5 \bar{L}^8} \\ &\times \sum_{i=1}^2 p_i [D_1 \sin^2 \kappa_i \cos 2\delta_i + D_2 (2 - 3 \sin^2 \kappa_i)] , \end{aligned} \quad (82)$$

$$\left\langle \frac{dL}{dt} \right\rangle_{DD} = \frac{G^2 d_1 d_2 (-2E\mu)^{3/2}}{5c^5 \bar{L}^8} [D_1 \mathcal{B}_0 + D_2 \mathcal{A}_0] , \quad (83)$$

ahol  $D_k$  :

$$\begin{aligned} D_1 &= -6\mu \bar{A}^2 (31E\bar{L}^2 + 90G^2 m^2 \mu^3) , \\ D_2 &= 252E^2 \bar{L}^4 + 1200G^2 E \bar{L}^2 m^2 \mu^3 + 805G^4 m^4 \mu^6 . \end{aligned} \quad (84)$$

### 4.0.3 Szögek változása

A szögek időfejlődésének meghatározásához vegyük az ő definíciójukat:  $\kappa_i = \cos^{-1}(\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{L}})$ , ( $i = 1, 2$ ),  $\gamma = \cos^{-1}(\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2)$ , és deriváljuk ezeket időszerint.

A két spinvektor által bezárt szög  $\gamma$  változására kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \cos \gamma = \frac{d}{dt} (\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2) = \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \frac{d\hat{\mathbf{S}}_2}{dt} + \hat{\mathbf{S}}_2 \cdot \frac{d\hat{\mathbf{S}}_1}{dt} .$$

A jobb oldalon álló kifejezés spin-orbit járulékai a [18] -ban vannak számolva, a spin-spin kölcsönhatás pedig, mint az látható [20] -ben nem ad újabb járulékot. A kvadrupol-monopol és dipól-dipól kölcsönhatások esetében (71) -ből következik:

$$\frac{d}{dt} \cos \gamma \simeq 0 . \quad (85)$$

A  $\kappa_i$  szögek esetében a helyzet bonyolultabb. Definíciójukból következik, hogy:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \cos \kappa_i &= \frac{d}{dt} \left( \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \frac{\mathbf{L}}{L(\chi)} \right) \\ &= \frac{1}{L(\chi)} \left[ \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \frac{d(\mathbf{J} - \mathbf{S}_1 - \mathbf{S}_2)}{dt} - \frac{dL}{dt} \cos \kappa_i + \mathbf{L} \cdot \frac{d\hat{\mathbf{S}}_i}{dt} \right] . \end{aligned} \quad (86)$$

A megkövetelt pontosság miatt minden poszt-newtoni tagban végrehajtható a  $L(\chi) \rightarrow \bar{L}$  csere. A pálya impulzusmomentum nagyságának időfejlődése:

$$\frac{dL}{dt} = \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} - \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{S}_1}{dt} - \hat{\mathbf{L}} \cdot \frac{d\mathbf{S}_2}{dt} . \quad (87)$$

Beírva ezeket (86) egyenletbe, és figyelembe véve, hogy  $\hat{\mathbf{S}}_i \cdot d\mathbf{S}_i/dt = 0$  kapom:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \cos \kappa_i &= \frac{1}{L(\chi)} (\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \frac{d\mathbf{J}}{dt} \\ &+ \frac{1}{L} \left[ -\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \frac{d\mathbf{S}_j}{dt} + \hat{\mathbf{L}} \cdot \left( \frac{d\mathbf{S}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{S}_2}{dt} \right) \cos \kappa_i + \mathbf{L} \cdot \frac{d\hat{\mathbf{S}}_i}{dt} \right], \quad (88) \end{aligned}$$

ahol  $j \neq i$ . A (71) -ből azonnal látszik, hogy a  $\kappa_i$  szögek változásának átlagolásakor a szögletes zárójelben lévő kifejezés eltűnik. Mivel célunk a periódus alatti átlag változás meghatározása, így a szögletes zárójelben lévő kifejezést nem kell figyelembe venni a továbbiakban.

A (88) egyenlet első tagjának kiértékelésére szükséges a teljes impulzusmomentum veszteség  $d\mathbf{J}/dt$  struktúrája [16] :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{J}}{dt} &= \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_N + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{pn} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{2pn} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{so} \\ &+ \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{ss} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{QM} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{DD} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{uszály}. \quad (89) \end{aligned}$$

A vezető rendű járulékot régebben kiszámolta Peters [7], a  $pn$  járulékot Junker és Schäfer [12], az  $so$  járulékot Kidder [16], és a  $2pn$  járulékot Gopakumar és Iyer [11]  $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{S}_i$  és  $\dot{r}$  függvényeként. Az uszály vezető rendbeli járuléka 3/2 poszt-newtoni rendnél jelenik meg és időbeli átlagát Rieth és Schäfer [17] adta meg Fourier soros alakban:

$N, pn, 2pn$  járulékok leírhatók a következőképpen:

$$\left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{N, pn, 2pn} = \Gamma_{0, 1, 2} \cdot \mathbf{L}_N \quad (90)$$

ahol a  $\Gamma_{0, 1, 2}$  együtthatók kiolvashatók [16] -ben (3.28.a,b)-ből és [11] -ben (3.9.d)-ből. Hasonló alakban kifejezhető az uszály időbeli átlaga, amelyet [17] -ben (84) adja:

$$\left\langle \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right\rangle_{uszály} = \Gamma_{uszály} \cdot \mathbf{L}_N. \quad (91)$$

A pálya impulzusmomentum kifejezése:

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_N + \mathbf{L}_{PN} + \mathbf{L}_{2PN} + \mathbf{L}_{SO} = (1 + \gamma_1 + \gamma_2) \mathbf{L}_N + \mathbf{L}_{SO}. \quad (92)$$

Ebből meghatározható a pálya impulzusmomentum:

$$\mathbf{L}_N = (1 - \gamma_1 - \gamma_2 + \gamma_1^2) \mathbf{L} - \mathbf{L}_{SO}. \quad (93)$$

A  $\gamma_{1, 2}$  együtthatók felismerhetők [16] -ben (2.9.b,d)-ből. Második poszt-newtoni rendig írhatjuk:

$$\left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{N+pn+2pn} = (\Gamma_0 + \eta_1 + \eta_2) \mathbf{L} - \Gamma_0 \cdot \mathbf{L}_{SO} \quad (94)$$



és

$$\left\langle \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right\rangle_{uszály} = \Gamma_{uszály} \cdot \mathbf{L}, \quad (95)$$

ahol a (94) -ben szereplő  $\eta_{1,2}$  együttthatók kifejezhetők  $\Gamma_{0,1,2}$  és  $\gamma_{1,2}$  -vel:

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \Gamma_1 - \Gamma_0 \gamma_1 \\ \eta_2 &= \Gamma_2 - \Gamma_1 \gamma_1 - \Gamma_0 (\gamma_2 - \gamma_1^2). \end{aligned} \quad (96)$$

Összevetve (88) , (89) , (94) egyenleteket és felhasználva

$$(\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \mathbf{L} = 0 \quad (97)$$

azonosságot, kapjuk:

$$\begin{aligned} \frac{1}{L(\chi)} (\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right) &= \frac{1}{L} (\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \\ &\times \left\{ \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{uszály} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{so} \right. \\ &- \Gamma_0 \mathbf{L}_{SO} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{ss} + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{QM} \\ &\left. + \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{DD} \right\}. \end{aligned} \quad (98)$$

Az uszály átlagolásnál (95) és (97) miatt eltűnik.

A (98) egyenlet második és harmadik tagja spin-pálya, a negyedik tag pedig spin-spin jellegű járuléka a  $\kappa_i$  szögek sugárzási veszteségéhez. A spin-pálya korrekciókat [18] (4.4) adja, a spin-spint [20] (4.1), (4.2) és (4.3).

Végősoron a kvadrupol-monopol kölcsönhatás járulékára  $-\frac{d}{dt} \cos \kappa_i$  -ben:

$$\left( \frac{d}{dt} \cos \kappa_i \right)_{QM} \simeq \frac{1}{L} (\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{QM} \quad (99)$$

adódik, és ugyanilyen kifejezés a dipól-dipól járulékra:

$$\left( \frac{d}{dt} \cos \kappa_i \right)_{DD} \simeq \frac{1}{L} (\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{DD} \quad (100)$$

Ez a kifejezés paraméteres alakban ( $\chi$ -vel megadva) a következőképpen fest:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\bar{L}}(\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{QM} &= \frac{3G^2 m^3}{10c^5 \mu \bar{L}^2 r^7} \sin \kappa_i \sum_{j=1}^2 p_j \sin 2\kappa_j \\ &\times \left\{ \sum_{n=1}^3 u_n \cos(n\chi + \delta_i + \delta_j) \right. \\ &+ u_4 \sin \chi \sin(\delta_i - \delta_j) \\ &\left. + u_5 \cos(\delta_i - \delta_j) \right\}, \end{aligned} \quad (101)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\bar{L}}(\hat{\mathbf{S}}_i - \hat{\mathbf{L}} \cos \kappa_i) \cdot \left( \frac{d\mathbf{J}}{dt} \right)_{DD} &= \frac{3G d_1 d_2}{5c^5 \mu^2 \bar{L}^2 r^7} \sin \kappa_i \\ &\times \sum_{j=1}^2 \left\{ \mu_{3-j|z} \sum_{n=1}^3 u_n [B_j \sin(n\chi + \delta_i + \delta_j) \right. \\ &- C_j \cos(n\chi + \delta_i + \delta_j)] \\ &- u_4 \sin \chi [B_j \cos(\delta_j - \delta_i) + C_j \sin(\delta_j - \delta_i)] \\ &- u_5 [B_j \sin(\delta_j - \delta_i) \\ &\left. - C_j \cos(\delta_j - \delta_i)] \right\}, \end{aligned} \quad (102)$$

ahol  $\mu_{3-j|z}$  a mágneses dipólmomentum vektor  $z$  komponense,  $u_i$  együttthatók pedig:

$$\begin{aligned} u_1 &= -u_3 = \mu \bar{A} r (2\mu E r^2 - 3\bar{L}^2), \\ u_2 &= 2\bar{L}^2 (Gm\mu^2 r + 3\bar{L}^2), \\ u_4 &= 2\mu \bar{A} r (2\mu E r^2 - 5\bar{L}^2), \\ u_5 &= 2\bar{L}^2 (4\mu E r^2 + Gm\mu^2 r - 5\bar{L}^2). \end{aligned} \quad (103)$$

A reziduum tétel segítségével az átlagolás elvégezhető:

$$\left\langle \frac{d\gamma}{dt} \right\rangle = 0 \quad (104)$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle &= \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{SO} + \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{SS-self} \\ &+ \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{SS} + \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{QM} \end{aligned} \quad (105)$$

$$\left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{SO} \quad [18] - \text{ban (4.4) adja}, \quad (106)$$

$$\left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{SS-self} \quad [20] - \text{ban (4.7) adja}, \quad (107)$$

$$\left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{S_1 S_2} \quad [20] - \text{ban (4.8) adja}, \quad (108)$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{QM} &= \frac{3G^2 m^3 \mu (-2\mu E)^{3/2}}{10c^5 \bar{L}^9} \sum_{j=1}^2 p_j \sin 2\kappa_j \\ &\times [V_1 \cos(\delta_i + \delta_j) + V_2 \cos(\delta_i - \delta_j)] , \end{aligned} \quad (109)$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d\kappa_i}{dt} \right\rangle_{DD} &= \frac{3G d_1 d_2 (-2E\mu)^{3/2}}{5c^5 \bar{L}^9} \\ &\times \sum_{j=1}^2 \mu_{3-j|z} \{ V_1 [\sigma_j \cos(\delta_i + \delta_j) - \rho_j \sin(\delta_i + \delta_j)] \\ &+ V_2 [\sigma_j \cos(\delta_i - \delta_j) + \rho_j \sin(\delta_i - \delta_j)] \} , \end{aligned} \quad (110)$$

ahol a  $V_{1-2}$  együtthatók:

$$\begin{aligned} V_1 &= 40E^2 \bar{L}^4 + 90G^2 m^2 \mu^3 E \bar{L}^2 + 35G^4 m^4 \mu^6 \\ V_2 &= 48E^2 \bar{L}^4 + 140G^2 m^2 \mu^3 E \bar{L}^2 + 70G^4 m^4 \mu^6 . \end{aligned} \quad (111)$$

A (104)-(109) egyenletek adják a szögek evolúciójának teljes leírását második poszt-newtoni rendig.

## 5 ÖSSZEFOGLALÓ

Fő eredményként meghatároztuk a második poszt-newtoni rendű kvadrupol-monopol és dipól-dipól járulékokat a gravitációs sugárzási visszahatásokban. Kiszámoltuk a pályaelemek egyrészével ekvivalens energia és a pálya impulzusmomentum nagyságának veszteségeit, valamint a saját-perdületek és a pálya-impulzusmomentum relatív irányait jellemző szögek változását. A veszteségek elsőrendű zárt differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, mely numerikus fejlesztésre

alkalmas. Általánosítottuk a valódi és excentrikus anomália paraméterezéseket a perturbált mozgások radiális részének leírására, a szekuláris kifejezéseket pedig a reziduum tétellel számoltuk, saját készítésű REDUCE analitikus programok felhasználásával.

Az energiavesztesség (65)-(68), pálya impulzus momentum nagyságának vesztesége (80)-(83), kiegészítve a megfelelő spin-pálya kifejezésekkel [18] -ből (a következő helyettesítésekkel:  $L \rightarrow \bar{L}$  and  $A_0 \rightarrow \bar{A}$ ), spin-spin kifejezésekkel [19] -ből és poszt-newtoni kifejezésekkel [11] -ből, megadja a teljes sugárzási visszahatást a második poszt-newtoni rendig.

A  $\kappa_i$  és  $\gamma$  szögek időfejlődéséhez az összes járulék fel van sorolva a IV. rész utolsó alfejezetében.

Végül összehasonlítjuk az energiavesztésre vonatkozó eredményeket a Poisson által számolttal [21], ami körpályákra vonatkozik. A körpálya határesetét véve a [21] -ban egy perturbációját kapom a Kepler féle körpályának. A körpálya feltételeket lehetetlen alkalmazni a nem perturbált pályára  $E_N = E - E_{QM} = -Gm\mu/2r_0$  és  $L_N^2 = L^2(\chi) = (\bar{L} + \delta L)^2 = Gm\mu^2 r_0$  ( $r_0$  a nem perturbált pályának a sugara), mert  $E_{QM}$  és  $\delta L$  nem állandók míg  $E$ ,  $\bar{L}$  és  $r_0$  azok. Ez arra a megjegyzésre késztet minket, hogy a pályák nem lehetnek szigorúan kör alakúak. Hanem a körpálya feltételeket átlagos értelemben kell használni. Felhasználva még, hogy  $\delta L$  szögátlaga eltűnik:

$$\begin{aligned}\bar{E}_N &= E - \bar{E}_{QM} = -Gm\mu/2r_0, \\ L_N^2 &= \bar{L}^2 = Gm\mu^2 r_0.\end{aligned}\quad (112)$$

Ezeket az értékeket behelyettesítve  $E_{QM}$  szögátlagába (ami már második PN rendű) kapjuk, hogy:

$$E_{QM} = \frac{Gm^3\mu}{4r_0^3} \sum_{i=1}^2 p_i (3 \cos^2 \kappa_i - 1). \quad (113)$$

Kifejezve  $E$  és  $\bar{L}$  -t (112) -ből, (113) -ből és behelyettesítve őket (65) - (67) -ig megkapjuk a sugárzási energiavesztéséget a fenti módon értelmezett körpályára vonatkozóan.

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = -\frac{32G^4 m^3 \mu^2}{5c^5 r_0^5} \left[ 1 - 6 \frac{m^2}{r_0^6} \sum_{i=1}^2 p_i (3 \cos^2 \kappa_i - 1) \right]. \quad (114)$$

Kihhasználva a perturbálatlan körpálya  $r_0$  sugara és a perturbált pálya  $\langle v \rangle$  átlag sebessége közötti összefüggést adódik:

$$r_0 = \frac{Gm}{\langle v \rangle^2} \left[ 1 - \frac{\langle v \rangle^4}{G^2} \sum_{i=1}^2 p_i (3 \cos^2 \kappa_i - 1) \right], \quad (115)$$

és azt találtuk, hogy a körpályán számolt átlagos energiavesztesség megegyezik a [21] -beli (22) összefüggéssel.

A dipól-dipól kölcsönhatás vizsgálata körpálya határesetben folyamatban van.

## 6 Függelék: A SPINPRECESSZIÓS EGYENLET LEVEZETÉSE

A kettős kompakt rendszer komponenseit tengelyszimmetrikus merev testekként kezeljük, így a kvadrupol-monopol kölcsönhatás által perturbált rendszer Lagrange függvénye [21], [24] a következő alakba írható:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \mathcal{L}_N + \mathcal{L}_{QM} , \\ \mathcal{L}_N &= \frac{\mu\dot{r}^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \Theta_i' \Omega_i^2 + \frac{G\mu m}{r} , \\ \mathcal{L}_{QM} &= \frac{G\mu m^3}{2r^5} \sum_{i=1}^2 p_i \left[ 3 \left( \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r} \right)^2 - r^2 \right] ,\end{aligned}\quad (116)$$

Ezután felírjuk gömbi polár koordinátákban a Lagrange függvényt. Ehhez szükséges néhány kifejezés:

$$\hat{\mathbf{S}}_i = (\sin \kappa_i \cos \psi_i, \sin \kappa_i \sin \psi_i, \cos \kappa_i), \quad (117)$$

$$\mathbf{r} = r(\cos \psi, \sin \psi, 0), \quad (118)$$

$$r\hat{\mathbf{S}}_i = r \sin \kappa_i \cos(\psi - \psi_i), \quad (119)$$

$$\dot{\mathbf{r}}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\psi}^2, \quad (120)$$

Kell még  $\Omega_i$  Euler szögekkel való kifejezése.  $\Omega_i$  felbontható három tengely körüli forgatásra. Ez a felbontás a tengelyek lerögzítése esetén sem egyértelmű. A dolgozat végén található 3., 4. és 5. ábráról leolvasható:  $\Omega_i = \dot{\alpha}_i \hat{\mathbf{z}} + \dot{\beta}_i \hat{\mathbf{x}}_2 + \dot{\gamma}_i \hat{\mathbf{z}}_3$ .  $\Omega_i$ -t ezek után felírjuk az  $\hat{\mathbf{x}}_3, \hat{\mathbf{y}}_3, \hat{\mathbf{z}}_3$  bázisban, felhasználva, hogy:  $\hat{\mathbf{z}} = \cos \beta_i \hat{\mathbf{z}}_3 + \sin \beta_i \hat{\mathbf{y}}_2$ ,  $\hat{\mathbf{y}}_2 = \cos \gamma_i \hat{\mathbf{y}}_3 + \sin \gamma_i \hat{\mathbf{x}}_3$ ,  $\hat{\mathbf{x}}_2 = \cos \gamma_i \hat{\mathbf{x}}_3 - \sin \gamma_i \hat{\mathbf{y}}_3$ :

$$\begin{aligned}\Omega_i &= (\dot{\beta}_i \cos \gamma_i + \dot{\alpha}_i \sin \beta_i \sin \gamma_i , \\ &\quad -\dot{\beta}_i \sin \gamma_i + \dot{\alpha}_i \sin \beta_i \cos \gamma_i , \dot{\alpha}_i \cos \beta_i + \dot{\gamma}_i ) .\end{aligned}\quad (121)$$

Az  $\hat{\mathbf{x}}_2 = \hat{\mathbf{x}}_1 \cos \alpha_i + \hat{\mathbf{y}}_1 \sin \alpha_i$ ,  $\hat{\mathbf{z}}_3 = \hat{\mathbf{z}}_2 \cos \beta_i - \hat{\mathbf{y}}_1 \sin \beta_i$ ,  $\hat{\mathbf{y}}_1 = \hat{\mathbf{y}}_2 \cos \alpha_i - \hat{\mathbf{x}}_1 \sin \alpha_i$  kifejezésekkel pedig  $\Omega_i$  felírható az  $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}$  bázisban:

$$\begin{aligned}\Omega_i &= (\dot{\beta}_i \cos \alpha_i + \dot{\gamma}_i \sin \beta_i \sin \alpha_i , \\ &\quad \dot{\beta}_i \sin \alpha_i - \dot{\gamma}_i \sin \beta_i \cos \alpha_i , \dot{\gamma}_i \cos \beta_i + \dot{\alpha}_i ) .\end{aligned}\quad (122)$$

A jelöléseink szerint  $\alpha_i = \psi_i - \pi/2$ ,  $\beta_i = -\kappa_i$ ,  $\gamma_i = -\delta_i$  így:

$$\begin{aligned}\Omega_i &= (-\dot{\kappa}_i \sin \psi_i - \dot{\delta}_i \sin \kappa_i \cos \psi_i , \\ &\quad \dot{\kappa}_i \cos \psi_i - \dot{\delta}_i \sin \kappa_i \sin \psi_i , -\dot{\delta}_i \cos \kappa_i + \dot{\psi}_i ) ,\end{aligned}\quad (123)$$

A  $\psi_i$  változóra felírjuk az Euler-Lagrange egyenletet és kapjuk:

$$\Theta'_i(\boldsymbol{\Omega}_i \cdot \hat{\mathbf{z}}) = \frac{3G\mu m^3}{2r^3} p_i \sin^2 \kappa_i \sin 2(\psi - \psi_i) , \quad (124)$$

A jobboldalt átalakíthatjuk más alakba, felhasználva, hogy:  $\sin^2 \kappa_i \sin 2(\psi - \psi_i) = 2 \sin \kappa_i \cos(\psi - \psi_i) \sin \kappa_i (\sin \psi \cos \psi_i - \cos \psi \sin \psi_i) = -2 (\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{S}}_i) (\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{S}}_i) \cdot \hat{\mathbf{z}}$ . Így a spinprecessziós egyenlet  $\hat{\mathbf{z}}$  komponenséhez jutottunk. A másik két komponens a  $\kappa_i$  változóra felírt Euler-Lagrange egyenletéből vezethető le. Az Euler-Lagrange egyenlet a  $\kappa_i$ -re:

$$\begin{aligned} \Theta'_i \dot{\boldsymbol{\Omega}}_i \cdot (-\sin \psi_i, \cos \psi_i, 0) &= \Theta'_i \boldsymbol{\Omega}_i \cdot (\dot{\psi}_i \cos \psi_i - \dot{\delta}_i \cos \kappa_i \cos \psi_i \\ &\quad , \dot{\psi}_i \sin \psi - \dot{\delta}_i \cos \kappa_i \sin \psi_i , \dot{\delta}_i \sin \kappa_i) \\ &\quad + \frac{3G\mu m^3}{2r^3} p_i \sin 2\kappa_i \cos^2(\psi - \psi_i) . \end{aligned} \quad (125)$$

A jobboldal első tagja egy azonosság:

$$\begin{aligned} &\Theta'_i \boldsymbol{\Omega}_i \cdot (\dot{\psi}_i \cos \psi_i - \dot{\delta}_i \cos \kappa_i \cos \psi_i , \dot{\psi}_i \sin \psi - \dot{\delta}_i \cos \kappa_i \sin \psi_i , \dot{\delta}_i \sin \kappa_i) \\ &= \Theta'_i \boldsymbol{\Omega}_i \cdot [(\boldsymbol{\Omega}_i \cdot \hat{\mathbf{z}}) \cos \psi_i , (\boldsymbol{\Omega}_i \cdot \hat{\mathbf{z}}) \sin \psi_i , -(\boldsymbol{\Omega}_i \cdot \hat{\mathbf{x}}) \cos \psi_i - (\boldsymbol{\Omega}_i \cdot \hat{\mathbf{y}}) \sin \psi_i] \\ &= -\Theta'_i \boldsymbol{\Omega}_i \cdot \{\boldsymbol{\Omega}_i \times [\hat{\mathbf{z}} \times (\cos \psi_i, \sin \psi_i, 0)]\} = 0 . \end{aligned} \quad (126)$$

A (125)-at trigonometriai azonosságokat felhasználva tovább alakítjuk:

$$\begin{aligned} -\Theta'_i (\dot{\boldsymbol{\Omega}}_i \cdot \hat{\mathbf{x}}) \sin \psi_i + \Theta'_i (\dot{\boldsymbol{\Omega}}_i \cdot \hat{\mathbf{y}}) \cos \psi_i &= \frac{3G\mu m^3}{r^3} p_i \sin \kappa_i \cos(\psi - \psi_i) \\ &\quad \times \cos \kappa_i (\cos \psi \cos \psi_i \\ &\quad + \sin \psi \sin \psi_i) . \end{aligned} \quad (127)$$

Felhasználjuk (119)-et, majd  $\cos \psi_i$  és  $\sin \psi_i$  együtthatóit egyenlővé téve az alábbi két kifejezéshez jutunk:

$$\Theta'_i (\dot{\boldsymbol{\Omega}}_i \cdot \hat{\mathbf{x}}) = -\frac{3G\mu m^3}{r^3} p_i (\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{S}}_i) \cos \kappa_i \sin \psi , \quad (128)$$

$$\Theta'_i (\dot{\boldsymbol{\Omega}}_i \cdot \hat{\mathbf{y}}) = \frac{3G\mu m^3}{r^3} p_i (\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{S}}_i) \cos \kappa_i \cos \psi . \quad (129)$$

Tekintsük az  $\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{S}}_i$  gömbi koordinátákban adott kifejezését:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{S}}_i &= (\sin \psi \cos \kappa_i , -\cos \psi \cos \kappa_i , \\ &\quad \cos \psi \sin \kappa_i \sin \psi_i - \sin \psi \sin \kappa_i \cos \psi_i) , \end{aligned} \quad (130)$$

amelyből leolvasható, hogy  $\cos \kappa_i \sin \psi = (\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{S}}_i) \cdot \hat{\mathbf{x}}$  és  $\cos \kappa_i \cos \psi = (\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{S}}_i) \cdot \hat{\mathbf{y}}$ . Így megkaptuk a spinprecessziós egyenlet  $\hat{\mathbf{x}}$  és  $\hat{\mathbf{y}}$  komponensét. Az eredményeink

egy vektori egyenletbe foglalhatók. A (128), (129), (124) és (130) kifejezésekből adódik a spinprecessziós egyenlet:

$$\dot{\hat{\mathbf{S}}}_i = -\frac{3G\mu m^3}{r^5} p_i (\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \mathbf{r}) (\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{S}}_i) . \quad (131)$$

## References

- [1] A. Abramovici et al., *Science* **256**, 325 (1992).
- [2] C. Bradaschia et al., *Nucl. Instrum. Methods A* **289** , 518 (1990).
- [3] J. Hough, in *Proceedings of the Sixth Marcell Grossmann Meeting*, edited by H. Sato and T. Nakamura (World Scientific, Singapore, 1992), p. 192.
- [4] K. Kuroda et al., in *Proceedings of International Conference on Gravitational Waves: Sources and Detectors*, eds. I. Ciufolini and F. Fiducaro (World Scientific, Singapore, 1997), p. 100.
- [5] P. Bender, I. Ciufolini, K. Danzmann, W. M. Folkner, J. Hough, D. Robertson, A. Rüdiger, M. C. W. Sandford, R. Schilling, B. F. Schutz, R. Stebbins, T. Sumner, P. Touboul, S. Vitale, H. Ward, and W. Winkler: *LISA: Pre-Phase A Report (MPQ 208)* (Max-Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Germany, 1996).
- [6] B. F. Schutz, to be published in *Proceedings of the 1997 Alpbach Summer School on Fundamental Physics in Space*, edited by A. Wilson, gr-qc/9710079.
- [7] P.C.Peters, *Phys. Rev.* **136**, B1224 (1964).
- [8] G. D. Quinlan and S. L. Shapiro, *Astrophys. J., Lett. Ed.* **321**, 199 (1987)
- [9] D. Hills and P. L. Bender, *Astrophys. J., Lett. Ed.* **445**, L7 (1995).
- [10] K. Martel and E. Poisson, *Gravitational waves from eccentric compact binaries: Reduction in signal-to-noise ratio due to nonoptimal signal processing*, gr-qc/9907006  
K. Martel, *Detection of Gravitational Waves from Eccentric Compact Binaries*, gr-qc/9908043.
- [11] A. Gopakumar and B. R. Iyer, *Phys. Rev D***56**, 7708 (1997).
- [12] W.Junker and G.Schäfer, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **254** , 146 (1992).
- [13] B. M. Barker and R. F. O’Connell, *Phys. Rev D***12**, 329 (1975). Comparison is immediate by changing their notations  $M$ ,  $\mathbf{n}^{(i)}$ ,  $J_2^{(i)}$ ,  $I^{(i)}$ ,  $\Delta I^{(i)}$ ,  $\omega^{(i)}$  to  $m$ ,  $\hat{\mathbf{S}}_i$ ,  $-m^2 p_i$ ,  $\Theta'_i$ ,  $-Q_i$ ,  $\Omega_i$  respectively.

- [14] T.A.Apostolatos, C.Cutler, G.J.Sussman and K.S.Thorne, Phys. Rev D**49**, 6274 (1994).
- [15] L. Kidder, C. Will, and A. Wiseman, Phys. Rev D**47**, 4183 (1993).
- [16] L. Kidder, Phys. Rev D**52**, 821 (1995).
- [17] R. Rieth and G. Schäfer, Class. Quantum Grav. **14**, 2357 (1997).
- [18] L. Á. Gergely, Z. Perjés, and M. Vasúth, Phys. Rev D**58**, 124001 (1998).
- [19] L.Á. Gergely, Phys. Rev D**61**, 024035 (2000).
- [20] L.Á. Gergely, Phys. Rev D**62**, 024007 (2000).
- [21] E. Poisson, Phys. Rev D**57**, 5287 (1998).
- [22] K. Ioka, K. Taniguchi, Astrophys. J. **537** , 327 (2000).
- [23] L. Á. Gergely, Z. Perjés, and M. Vasúth, Astrophys. J. Suppl. **126**, 79 (2000).
- [24] H. Goldstein, *Classical Mechanics*, 2nd ed. (Addison-Wesley, Reading, MA, 1980), Chap. 5.
- [25] H. Tagoshi, A. Ohashi, and B. J. Owen, Phys. Rev D**63**, 044006 (2001).
- [26] L. Á. Gergely, Z. Perjés, and M. Vasúth, Phys. Rev D**57**, 3423 (1998).